

## ご存じですか？

### 带状疱疹には、予防するワクチンがあります

带状疱疹は、ワクチンで予防できます。ワクチンには、感染症の原因となる細菌やウィルスの病原性を弱くしたものや、成分の一部を取り出したものまた病原性を全くなくしたものがあります。ワクチンを体内に接種すると、そのワクチンの成分（細菌やウィルス）に対しての免疫力を高め、病気の発症や重症化を押えることができます。

#### ◆带状疱疹の予防の適用があるワクチン◆

分類	サブユニットワクチン	生ワクチン
商品名	シングリックス筋注用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」
有効成分	水痘带状疱疹ウィルスgE抗原	水痘带状疱疹ウィルスgE抗原
組成	添加物 精製白糖、ポリソルベート80、リン酸二水素ナトリウム、リン酸二カリウム、MPL、QS-21、ジオレオイルホスファチジルコリン、無水リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素カリウム、塩化ナトリウム	塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、精製白糖、L-グルタミン酸ナトリウム、カナマイシン硫酸塩、エリスロマイシンラクトビオン酸塩
会社名	ジャパンワクチン	阪大微研ー田辺三菱、武田薬品
効能	带状疱疹の予防	水痘及び50歳以上の者に対する带状疱疹の予防
用法・用量	抗原製剤を専用溶解用液全量で溶解し通常50歳以上の成人に0.5mLを2か月間隔で2回筋肉内に接種する	本剤を添付の溶剤（日本薬局方注射用水）0.7mLを溶解し通常、その0.5mLを1回皮下に注射する
貯法	遮光し、凍結を避けて、2～8° Cで保存	遮光して、5° C以下に保存
持続期間	10年間	5年間
費用	1回 22,000円	9,900円

注) 他のワクチンを接種する場合は、日数制限はありませんが数日間は発熱や接種部位が腫れることもあり2週間程度様子を見て下さい。ただし、生ワクチの連続接種の間隔は4週間空けてください。

★当院にて接種を行っています。ワクチン接種には予約が必要です。  
ご希望の方はお申し出ください。